



FORT DODGE ANIMAL HEALTH
Division of Wyeth Corporation

FICHA TÉCNICA

USO VETERINARIO

BACTERINA DE MYCOPLASMA GALLISEPTICUM - MG BAC[®]
Bacterina contra Mycoplasma gallisepticum.

DESCRIPCIÓN:	MG-BAC es un producto químicamente inactivado y emulsificado en aceite y elaborado a partir de una cepa de Mycoplasma gallisepticum (WVU = West Virginia University) altamente antigénica. Por tratarse de un producto inactivado, los microorganismos no son capaces de multiplicarse ni difundirse.
NOMBRE:	Bacterina contra Mycoplasma gallisepticum - MG Bac [®] .
PRESENTACIÓN:	1.000 dosis (500 ml)
ENVASES:	Frascos de plástico.
FORMA FARMACÉUTICA:	Emulsión oleosa. Más rápida liberación; mejor respuesta de memoria inmunológica.
DOSIS:	Inyectar 0,5 mL (0,5 cc) por vía intramuscular (músculo del pecho o la pierna) o subcutáneamente (en la base del cuello), con técnica aséptica. Solamente a las aves sanas. Vacunar aves de 3 semanas o mayores. Para obtener óptimos resultados revacunar 4 semanas después. En aves de postura vacunar antes del comienzo de la postura.
INDICACIONES:	En aves como coadyuvante en la prevención de infecciones ocasionadas por Mycoplasma gallisepticum.
COMPOSICIÓN:	Mycoplasma gallisepticum cepa WVU = West Virginia University. $\geq 10^{7.6}$ CFU's / dosis).
PRECAUCIONES:	Almacenar en la oscuridad entre 2° C- 7° C. No congelar. Usar todo el contenido una vez abierto. Utilizar una dosis por ave. Si se inyecta accidentalmente en una persona debe consultarse a un médico inmediatamente. No utilizar en animales enfermos o débiles.
TIEMPO DE RETIRO:	No vacunar dentro de los 42 días previos al sacrificio.
Reg ICA No:	1935 DB
PERÍODO DE VALIDEZ:	24 meses.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	Almacenar en la oscuridad entre 2° C- 7° C. No congelar. Mantener fuera del alcance de los niños.

Producida por Fort Dodge Animal Health, Iowa, Estados Unidos para Laboratorios Wyeth, Bogotá. e importada y distribuida por American Veterinaria Ltda, Bogotá.

