



FORT DODGE ANIMAL HEALTH
Division of Wyeth Corporation

FICHA TÉCNICA

USO VETERINARIO

POULVAC SE ND IB

Vacuna contra la Salmonella enteritidis; Bronquitis Infecciosa y Newcastle.

DESCRIPCIÓN:	Vacuna inactivada contra la enfermedad de Newcastle, Bronquitis infecciosa y salmonelosis aviar.
NOMBRE:	Poulvac SE ND IB.
PRESENTACIÓN:	Frasco por 300 mL conteniendo 1.000 dosis
ENVASES:	Frasco de polietileno de alta densidad, con tapón de caucho y agrafe de aluminio.
FORMA FARMACÉUTICA:	Emulsión oleosa.
DOSIS:	1 por cada ave sana.
INDICACIONES:	Está indicada para la vacunación de pollonas y reproductoras de reemplazo contra la enfermedad de Newcastle; Bronquitis infecciosa y ayuda a la reducción de colonización de Salmonella. Aplicar por vía subcutánea o intramuscular
COMPOSICIÓN:	Cada dosis de 0,3 ml contiene: Salmonella enteritidis Fago Tipo 4 Cepa D 1758 $\geq 2 \times 10^{11.0}$ UFC/mL Salmonella enteritidis Fago Tipo 8 Cepa Se.ceb.50 $\geq 2 \times 10^{11.0}$ UFC/mL Salmonella enteritidis Fago Tipo 13a Cepa 52-1 $\geq 2 \times 10^{11.0}$ UFC/mL Virus de la enfermedad de Newcatle tipo B1 cepa La Sota $\geq 2,52 \times 10^{9.0}$ DIE ₅₀ / mL Virus de la enfermedad de la Bronquitis Infecciosa cepa Mass IB 41 $\geq 3,16 \times 10^{8.0}$ DIE ₅₀ / mL
PRECAUCIONES:	Almacenar en la oscuridad entre 2° C- 7° C. No congelar. Usar todo el contenido una vez abierto. Utilizar una dosis por ave. No utilizar en animales enfermos o débiles.
TIEMPO DE RETIRO:	No vacunar dentro de los 21 días previos al sacrificio.
Reg ICA No:	7444 BV
PERÍODO DE VALIDEZ:	24 meses.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	Almacenar en la oscuridad entre 2° C- 7° C. No congelar. Mantener fuera del alcance de los niños.

Producida por Fort Dodge Animal Health, Iowa; Estados Unidos para Laboratorios Wyeth, Bogotá. e importada y distribuida por American Veterinaria Ltda, Bogotá, Colombia.

